


PREHĽAD MENEJ ZNÁMYCH A CHRÁNENÝCH DRUHOV RÝB A ICH ROZLIŠOVANIE

Vytvoril:

Martin Rajčan, MO SRZ Piešťany



Dôležitá poznámka:

- telo hlavátky je pretiahnutejšie a štíhlejšie oproti pstruhovi
- niektoré bodky sú do tvaru X
- kontrolný znak je chvostová plutva, tá je na rozdiel od pstruha viac vykrojená

Podobnosť s:



Pstruh potočný



Pstruh dúhový

Doba hájenia

1.1. - 31.10.

Hlavátka podunajská (Hucho Hucho)



Dôležitá poznámka:

- veľmi podobný s pstruhom potočným
- sfarbenie veľmi závisí od stanovišťa
- oproti PP má prevažne strieborné telo a tmavé škvrny s nepravidel'ným okrajom
- ide vlastne o jazernú formu pstruha potočného

Podobnosť s:



Pstruh potočný



Pstruh dúhový

Doba hájenia

1.9. - 15.4

Pstruh jazerný (Salmo trutta m.lacustris)

Dôležitá poznámka:

- nemýliť si so zubáčom veľkoústym!
- na rozdiel od veľkoústeho nemá typické „psie“ zuby, ale len drobné zúbky. Podľa tohto znaku sa najlepšie rozlišuje



Podobnosť s:



Zubáč veľkoústý

Doba hájenia

15.3. - 15.6.

Zubáč volžský (Stizostedion volgensis)

Dôležitá poznámka:

- hrebenačky sa považujú za indikátorov čistej vody
- obľubuje požíranie ikier iných druhov rýb, čo spôsobuje ich zvýšenú agresivitu voči tomuto druhu



Podobnosť s:



Hrebenačka pásavá – celoročne hájená!



Hrebenačka vysoká – celoročne hájená!

Doba hájenia

nehájená

Hrebenačka fríkaná (*Gymnocephalus cernuus*)



Dôležitá poznámka:

- pomerne málo vyskytujúci sa druh
- odolnejší ako sih maréna
- narozdiel od marény má vyššie telo, kratšiu hlavu a tupšie ukončené plutvy
- oba druhy sihov majú narozdiel od bielych rýb tukovú plutvičku!

Podobnosť s:



Sih maréna

Doba hájenia

1.9. - 31.12.

Sih peled' (*Coregonus peled*)



Dôležitá poznámka:

- živý sa hlavne planktónom
- neresí sa na povrchu a ikry unáša prúd
- úlovky sú väčšinou náhodné – podseknutím pri prívlači alebo položenej

Podobnosť s:



Tolstolobik pestrý

Doba hájenia

nehájený

Tolstolobik biely (*Hypophthalmichthys molitrix*)



Dôležitá poznámka:

- podobnosť s inými pleskáčmi
- spodné postavenenie úst
- veľmi dlhá análna plutva

Podobnosť s:



Pleskáč tuponosý



Pleskáč vysoký



Pleskáč zelenkavý

Doba hájenia

15.3. - 31.5.

Pleskáč siný (Abramis ballerus)



Dôležitá poznámka:

- v minulosti hojný výskyt, dnes sú hrúzy až na pár výnimiek na ústupe
- v kútoch úst má dva fúzy

Podobnosť s:



Hrúz fúzatý – celoročne chránený!
- (fúzy až po žiabre a zväčšenejšie)



Hrúz Kesslerov – celoročne chránený!
- (nemá šupiny na hrdle, fúzy po oči)

Doba hájenia

nehájený

Hrúz škvrnitý (Gobio gobio)



Dôležitá poznámka:

- u nás dorastá do max. cca 4 kg hmotnosti (rekord je 4,2 kg)
- v prvom roku života rastie veľmi rýchlo, následne sa rast spomaľuje

Podobnosť s:



Jeseter ruský – celoročne chránený!

Doba hájenia

15.3. - 31.5.

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)



Dôležitá poznámka:

- nemá plynový mechúr, preto sa pohybuje po dne rôznymi skákavými pohybmi

Podobnosť s:



Hlaváč pásoplutvý

Doba hájenia

15.3. - 31.5.

Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)



Dôležitá poznámka:

- ide o zavlačený druh, pravdepodobne od akvaristov
- samci stavajú pri nerese hniezdo a starajú sa o ikry ako aj o poter

Podobnosť s:

- Slničnica je prakticky nezameniteľná s iným, u nás sa vyskytujúcim, druhom. Najbližšie má k Ostračke veľkoustej, ktorá je tiež nepôvodným a u nás zriedkavým druhom



Ostračka veľkousta

Doba hájenia

nehájená

Slničnica pestrá (Lepomis gibbosus)



Dôležitá poznámka:

- zdržiava sa pod kameňmi
- 4 fúzy na prednej strane úst, 2 v kútikoch
- silná vrstva slizu

Podobnosť s:



Čík európsky – celoročne chránený!



Píľ severný – celoročne chránený!

Doba hájenia

nehájený

Slíž severný (Noemacheilus barbatulus)

CELOROČNE CHRÁNENÉ DRUHY RÝB





Kolok veľký (Zingel zingel)



Kolok vretenovitý (Zingel streber)



Hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)



Hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni)

Doba hájenia

celoročne

Ostriežovité (Percidae)



Karas zlatistý (*Carassius carassius*)



Plotica lesklá (*Rutilus pigus*)



Ploska pásavá (*Alburnoides bipunctatus*)



Plotica perleťová (*Rutilus meidingeri*)

Doba hájenia
celoročne

Kaprovité (Cyprinidae)



Šabl'a krivočiara (*Pelecus cultratus*)



Lopatka dúhová (*Rhodeus amarus*)



Hrúz fúzatý (*Gobio uranoscopus*)



Hrúz Kesslerov (*Gobio kessleri*)

Doba hájenia
celoročne

Kaprovité (Cyprinidae)



Jeseter ruský (*Acipenser gueldenstaedtii*)

Doba hájenia
celoročne

Jesetery (*Acipenseriformes*)



Čík európsky (*Misgurnus fossilis*)



Píž severný (*Cobitis taenia*)



Píž vrchovský (*Sabanejewia balcanica*)

Doba hájenia
celoročne

Pížovité (Cobitidae)



Blatniak tmavý (*Umbra krameri*)

Doba hájenia

celoročne

Blatniakovité (Umbridae)